

Behandlingskategori	I denne kategori placeres følgende patienter:
0	Gingivitispatienter (CAL = 0) med BOP > 15%
1	Parodontitispatienter (CAL > 0 og PD ≤ 5 mm) med: • BOP > 15% Og/eller • PD = 5 mm og BOP og/eller • furkaturinvolvering(er) sammen med PD ≤ 5 mm og BOP uanset grad
2	Parodontitispatienter (CAL > 0) • 1-2 tænder med PD ≥ 6 mm og/eller • 1-2 tænder med furkaturinvolvering grad 2 eller 3 sammen med PD ≥ 6mm ved furkaturesites
3	Parodontitispatienter (CAL > 0) • 3-8 tænder med PD ≥ 6 mm og/eller • 3 tænder med furkaturinvolvering grad 2 eller 3 sammen med PD ≥ 6mm ved furkaturesites
4	Parodontitispatienter (CAL > 0) • mindst 9 tænder med PD ≥ 6 mm og/eller • 4 tænder eller flere med furkaturinvolvering grad 2 eller 3 sammen med PD ≥ 6mm ved furkaturesites eller Parodontitispatienter hvor der pga. udtalt parodontal destruktion er brug for omfattende fast protetisk rehabilitering som følge af: 1. Mastikatorisk dysfunktion 2. Sekundær okklusal trauma 3. Bidkollaps 4. < 10 okkluderende tandar Erfaringsmæssigt vil der kun sjældent henvende sig patienter på IOOS, som vil kunne behandles efter kriterierne i denne sidste gruppe med behov for fast protetisk rekonstruktion. Skulle det imidlertid være tilfældet, skal en afdelingstandlæge fra PA kontaktes for at se patienten på undersøgelsesdagen.